BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 10 avril 1901.

Présidence de M. E. SIMON.

MM. A. Fauvel, de Caen et G.-A. Baer, ce dernier de retour de son voyage dans l'Amérique du Sud, assistent à la séance.

Distinction honorifique. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société que notre collègue M. L. Pottier vient d'être nommé officier d'Académie.

Admission. — M. L. Dufay, Grand-Maison, à Trois-Rivières (Guadeloupe). *Coléoptères, Insectes nuisibles aux cultures.*

Changements d'adresse. — Général Heimburger, à Bourg (Ain). — M. L. de Larminat, à Hanoï (Tonkin).

Communications.

Note sur le *Pyrrochoris apterus* Linn. macroptère [Hémipt.]

Par Maurice Royer.

Dans son *Synopsis des Hémiptères hétéroptères de France,* M. le docteur Puton considère la forme *macroptère* de *Pyrrochoris apterus* comme pas très rare; cependant que les différents Catalogues régionaux, Reiber et Puton (Alsace-Lorraine), Lethierry (Nord), Michel Dubois (Somme), Bucaille (Seine-Inférieure), Bellevoye (Moselle), Marchal (Saône-et-Loire), n'en font pas mention.

Populus, dans son Catalogue des hétéroptères de l'Yonne, dit que les individus macroptères de *Pyrrochoris apterus* L. ne sont pas rares à Coulanges.

M. l'abbé d'Antessanty (Catalogue des Hémiptères hétéroptères

de l'Aube) déclare n'avoir jamais pris d'exemplaires macroptères dans ce département.

M. l'abbé Dominique (Loire-Inférieure) dit que *Pyrrochoris apterus* pullule à Nantes et qu'il est *ordinairement* brachyptère.

Je possédais déjà deux exemplaires macroptères, provenant de Neuilly-sur-Seine et de Fontainebleau, quand, le 25 juillet de l'année dernière, je capturai sur le mur du château de la Celle St-Cloud (Seine-et-Oise), huit exemplaires macroptères, dont trois mâles et cinq femelles; deux de ces insectes étaient accouplés; je trouvai également une femelle macroptère accouplée avec un exemplaire mâle brachyptère.

J'ajouterai à titre de renseignement que Westhoff [1], en 1884, a jugé utile de donner des noms aux différents états de *Pyrrochoris apterus;* il a distingué la forme macroptère : *membranaceus,* et la forme macroptère ailée : *pennatus.* Tous mes exemplaires appartiendraient à la forme macroptère ailée : *pennatus.*

Note sur une Araignée exotique (*Hasarius Adansoni* Aud.) acclimatée dans les serres chaudes, aux environs de Paris

Par E. Simon.

Notre collègue M. E. Boudier, président honoraire de la Société de Mycologie et entomologiste très distingué, m'a signalé la présence, dans diverses serres chaudes des environs de Paris, d'une Araignée de la famille des *Salticides,* qui n'est autre que le *Hasarius Adansoni* Audouin. Cette espèce, qui se laisse facilement transporter, est répandue dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde, mais elle n'a jamais été trouvée en France qu'accidentellement.

D'après les renseignements obtenus par M. E. Boudier de M. E. Louvet, jardinier spécialiste pour la culture des Orchidées, le *Hasarius Adansoni* Aud. abonde dans les serres chaudes du domaine de Laversine (appartenant à M. de Rothschild), aux Haies, près Creil; la température de ces serres ne s'abaisse pas au-dessous de 17° ou 18° l'hiver, l'été il y règne une chaleur de 22° à 25°, on y cultive des *Croton, Dracaena* et des Orchidées du Brésil, du Mexique et de l'Inde (*Cattleya, Vanda,* etc.) importés directement. Mais il ne se montre pas

(1) Catalogue des Hémiptères de Westphalie.

dans les serres plus froides où l'on cultive des plantes moins délicates. L'Araignée existe dans beaucoup de serres analogues depuis plusieurs années, elle s'y reproduit, surtout au printemps, et est connue dans les établissements horticoles de France et de l'étranger où l'on reçoit des importations d'Orchidées, sous le nom d'*Araignée du Brésil*.

Descriptions de *Ptinus* nouveaux, de l'île Maurice [Col.]

Par Maurice Pic.

M. Paul Carié, de l'île Maurice, m'a récemment communiqué quelques *Ptinidae* de sa région, parmi lesquels plusieurs espèces ou variétés nouvelles que je vais décrire ici. Les deux nouvelles espèces de *Ptinus* peuvent se placer dans le voisinage de *vestitus* Pic (1); elles s'en distingent, à première vue, par la coloration plus claire et l'absence de dessin blanc sur les élytres, les antennes non épaissies à l'extrémité chez la ♀; ces deux espèces offrent une coloration analogue testacé-roussâtre, mais la première est plus robuste, moins courte, et a les antennes plus ou moins roussâtres, tandis que la deuxième est plus courte, surtout chez la ♀, et a les antennes noires; chez ces deux espèces le ♂ est moins court et offre les antennes un peu plus longues que la ♀. Outre ces deux espèces nouvelles, je rapporte provisoirement à *Ptinus vestitus*, comme variété nouvelle sous le nom de var. *Antelmei*, trois exemplaires provenant de Curepipe. Les deux espèces et la variété *Antelmei* figurent dans ma collection.

Ptinus Cariei, n. sp. — *Rufescens, satis elongatus, indistincte maculatus, griseo aut luteo-pubescens, haud hispidus; thorace gibboso; elytris modice punctato-striatis; antennis pedibusque rufescentibus.*

Assez allongé, roussâtre, parfois indistinctement maculé de brunâtre par suite d'épilation, assez densément revêtu d'une pubescence grisâtre ou jaunâtre, sans soies dressées. Tête grosse et large avec les yeux noirs, gros; antennes plus ou moins roussâtres, assez fortes, plus longues chez le ♂, article terminal un peu plus long que le précédent; prothorax robuste, relativement court et large, sillonné transversalement devant la base, muni sur son milieu de deux gibbosités pileuses et sur les côtés d'une sorte de dent large et courte pileuse; écusson plus long, à pubescence grisâtre; élytres un peu allongés, subparallèles, peu atténués à l'extrémité, droits en avant avec les

(1) *Ann. Soc. ent. Fr.*, LXVI, 1897 (paru en 1898), p. 396.

épaules marquées, mais arrondies, plus ou moins revêtus d'une pubescence grisâtre ou jaunâtre, laissant parfois des espaces en partie dénudés; stries ponctuées, peu fortes, avec les interstries peu larges, un peu relevés; pattes roussâtres, grêles; dessous du corps en partie revêtu d'une pubescence d'un gris blanchâtre. — Long. 2,5-3 mill.

Mont Corps-de-Garde (d'Emmerez et Carié).

Ptinus atricornis, n. sp. — *Rufescens, brevis, griseo aut luteo-pubescens, haud hispidus; antennis nigris; thorace subgibboso, elytris distincte punctato-striatis; pedibus rufescentibus.*

Court et large, roussâtre à l'exception des antennes qui sont noires (tête quelquefois en partie obscurcie), peu densément revêtu d'une pubescence grisâtre ou jaunâtre sans soies dressées. Tête grosse et large avec les yeux grisâtres, très gros; antennes fortes, noires, non épaissies à l'extrémité, plus longues chez le ♂, article terminal un peu plus long que le précédent; prothorax robuste, court et large, sillonné transversalement devant la base, un peu élevé et subgibbeux sur son milieu et orné de chaque côté d'une sorte de dent large et courte, parfois pileuse; écusson petit, à pubescence grisâtre; élytres courts et larges, subparallèles, distinctement atténués à l'extrémité, droits en avant avec les épaules bien marquées mais arrondies, revêtus d'une pubescence grisâtre ou jaunâtre modérément dense, ils offrent des stries ponctuées distinctes avec les interstries étroits un peu relevés; pattes roussâtres, grêles; dessous du corps peu pubescent. — Long. 2 mill.

Curepipe (G. Antelme).

Ptinus vestitus Pic var. **Antelmei**, n. var. — Foncé, revêtu d'une pubescence fauve ou obscure avec la tête ornée, sur les côtés, d'une pubescence grisâtre; antennes noires et robustes, paraissant épaissies à l'extrémité chez la ♀ et plus longues, presque filiformes chez le ♂; écusson à pubescence grisâtre; élytres plus ou moins revêtus d'une pubescence fauve ou obscure et ornés des dessins grisâtres suivants : une bande humérale transversale, deux macules obliquement placées et situées en dessous du milieu, une macule apicale, parfois peu distincte. — Long. 2,5-3 mill.

Curepipe (G. Antelme).

Diffère de *vestitus* Pic, dont je n'ai malheureusement plus le type sous les yeux, au moins par son dessin.

Nota. — Il convient de faire remarquer que chez les espèces de l'île

Maurice le sexe ♂ paraît différer ordinairement du sexe ♀ par la forme élytrale moins large, les antennes plus longues ou plus robustes et, peut-être quelquefois, par la présence d'oreillettes pileuses latérales sur le prothorax; ainsi, je rapporte à *Pt. maculatus* Pic (*An. Fr.*, LXVI, p. 400), en érigeant celui-ci au rang d'espèce, un exemplaire à coloration analogue mais plus allongé, à prothorax robuste, élargi sur son milieu, insecte surtout remarquable par ses antennes très robustes, plus fortes que chez la ♀. *Pt. maculatus* présente, avec une forme robuste, les pattes testacées; on peut rapporter à cette espèce comme variété, et sous le nom de *atripes*, une race de forme moins robuste et de taille plus petite, ayant les antennes assez fortes et les pattes foncées.

Revision des *Onychiinae* D.T. [Cynipides]

Par J.-J. Kieffer.

Les insectes de ce groupe se reconnaissent au second segment abdominal qui est liguliforme et plus court que le troisième.

Tableau des genres.

1. Écusson tronqué à son extrémité..... 2
— Écusson terminé par un prolongement en forme d'épine..... 4
2. Cellule radiale entièrement ouverte à la marge..... 1er genre. **Aspicera** Dahlb.
— Cellule radiale fermée à la marge au moins en partie..... 3
3. Écusson avec une fossette à sa base.... 2e genre. **Balna** Cam.
— Écusson avec deux fossettes à sa base. 3e genre. **Neralsia** Cam.
4. Mésonotum sans lignes élevées; écusson sans arête longitudinale en son milieu; cellule radiale fermée; tibias postérieurs non cannelés; pétiole abdominal lisse..... 4e genre. **Homalaspis** Gir.
— Mésonotum traversé par une ou trois carènes longitudinales; écusson avec une arête longitudinale et médiane; cellule radiale ouverte au moins à la marge; pétiole abdominal sillonné ou caréné..... 5
5. Cellule radiale ouverte à la base au moins en partie; tibias postérieurs cannelés.....

— Cellule radiale fermée à la base; tibias postérieurs non cannelés; écusson non creusé en une double gouttière..... ..... 5e genre. **Lambertonia**, n. g.

6. Cellule radiale entièrement ouverte à sa base, la nervure sous-costale cessant complètement à la naissance du radius; écusson creusé en gouttière de chaque côté de la carène médiane et traversé par des arêtes ou rides transversales. ..... 7e genre. **Onychia** Hal.

— Cellule radiale ouverte seulement en partie à sa base; écusson non creusé en une double gouttière, sans rides ou arêtes transversales..... 6e genre. **Tavaresia**, n. g.

1er Genre. **Aspicera** Dahlb.

Ce genre comprend les espèces européennes suivantes : *rugosa* (Hart.), *Hartigi* D. T. (*spinosa* Hart. nec Fonsc.), *spinosa* (Fonsc.), *bicolor* Dahlb., **Dahlbomi** n. nov. (*ediogaster* Dahlb. nec Ross.), *scutellata* Gir. (*ediogaster* Ross.), et les espèces américaines :

albihirta, flavipes, similis et *utahensis* Ashm., *bifoveolata* et *rufipes* Cress., *quinquelineata* (Say) Prov., et *nigricornis* Kirb. Nous y ajoutons les espèces nouvelles qui suivent :

sibirica, n. sp. — Noir; pattes rouges, sauf les hanches; base des cuisses et métatarses postérieurs bruns. Pronotum et mésonotum à peine chagrinés. Arêtes latérales du mésonotum s'arrêtant brusquement vis-à-vis de l'origine de la bifurcation de l'arête médiane; épine atteignant au moins les trois quarts de la longueur de l'écusson. — Taille ♀ 2,5 mill.

Sibérie. (Collection du général Radoszkowski).

Chlapowskii (1), n. sp. — Diffère du précédent par la couleur qui est comme chez *scutellata*, par les rides du pronotum et du mésonotum, par l'unique fossette du scutellum et par les arêtes latérales du mésonotum s'arrêtant bien avant la bifurcation de la médiane. — Taille ♀ 6 mill.

Russie. (Même collection).

longispina, n. sp. — Diffère du précédent par la coloration qui est comme chez *sibirica*, par la forme de l'échancrure du prothorax, par

(1) Dédié à M. le docteur Chlapowski, de Posen.

les deux fossettes de l'écusson nettement séparées. — Taille ♀ 3,5 mill.

Espagne. — Obtenu, par M. Cabrera y Diaz, d'une galle de *Cynips Mayri* Kieff.

brevispina, n. sp. — Antennes à peine plus courtes que le corps dans les deux sexes. Épine n'ayant que le tiers de la longueur de l'écusson. Noir ; pattes rouges, sauf les hanches ; pronotum chagriné. — Taille ♀ ♂ 2,5 à 3 mill.

Espagne. (Collection de M. Cabrera y Diaz).

coriacea, n. sp. — Diffère du précédent par les antennes de la femelle d'un tiers plus courtes que le corps, l'épine atteignant la moitié de la longueur de l'écusson, et la coloration noire et rouge du corps. — Taille ♀ 3,5 mill.

Corse. (Collection du Rév. Marshall).

2e Genre. **Balna** Cam.

L'unique espèce, *B. nigriceps* Cam., revient à l'Amérique.

3e Genre. **Neralsia** Cam.

Ce genre, qui ne me paraît pas différer du précédent, comprend trois espèces : *Cameroni* n. nov. (*rufipes* Cam. 1883 nec Cress. 1865), du Guatemala ; *rufipes* (Cress.) et *bifoveolata* (Cress.), de Cuba.

4e Genre. **Homalaspis** Gir. non Reinh.

Une seule espèce d'Europe : *noricus* Gir.

5e Genre. **Lambertonia**, n. g.

abnormis, n. sp. — Noir ; pattes rouges, hanches noires ; funicule d'un rouge sombre. — Taille ♂ 3 mill.

Hongrie. (Collection de M. Szepligeti).

Il faut encore ajouter à ce genre *ruficornis* (Thoms.) et probablement aussi *nigra* (Thoms. nec Hart.).

6e Genre. **Onychia** Hal.

Il faut rapporter ici les espèces européennes suivantes : *ligurica* Gir., *Latreillei* Hart., *Fonscolombei* Dahlb. et *Dufouri* Gir., ainsi que

l'espèce américaine *Provancheri* Ashm. Nous y ajoutons trois espèces et une variété nouvelles.

aberrans, n. sp. — Diffère de toutes par l'absence des deux carènes intermédiaires du mésonotum. Noir; thorax, antennes et pattes rouges au moins en partie. — Taille ♂ 4 mill.

Russie. (Collection du général Radoszkowski).

brevifurca, n. sp. — Noir et rouge; espace compris entre la bifurcation de la carène médiane du mésonotum tout au plus trois fois aussi long que large. Mésonotum chagriné. — Taille ♀ ♂ 3,6 à 4 mill.

France méridionale, Corse et Espagne.

areolata, n. sp. — Diffère des précédents par l'aréole des ailes qui est très bien formée; mésonotum ridé. Corps noir, rouge en partie. — Taille ♀ 4 mill.

Italie. (Collection de M. le docteur Magretti).

Dufouri Gir. var. **vitripennis**, n. var. — Ailes hyalines; fourche du mésonotum une fois et demie aussi longue que large. Pour le reste, semblable au type.

7e Genre. **Tavaresia**, n. g. (**Homalaspis** Reinh.).

Nous rapportons à ce genre deux espèces d'Europe, *notata* (Fonsc.) et *nigra* (Hart.), et une d'Amérique, *floridana* (Ashm.). Nous y ajoutons deux espèces nouvelles.

carinata, n. sp. — Diffère de toutes par le thorax rouge en partie et par la cellule radiale à peine ouverte à la base. — Taille : 3 mill.

France mérid. (Collection du Rév. Marshall).

sulcata, n. sp. — Diffère de *nigra* Hart. par les ailes teintées de jaune en leur milieu et par leurs sillons parapsidaux élargis sur tout leur parcours, à base non confluente avec les rameaux de la carène médiane. — Taille ♀ ♂ 3,10 à 3,50 mill.

France. — Obtenu par M. Carpentier, d'Amiens, de larves de Syrphides vivant d'*Aphis gallarum* Kalt.

Le même observateur a obtenu *Tavaresia nigra* (Hart.) de larves de Syrphides prédatrices de *Schizoneura lanuginosa*, et un peu plus tard,

M. Pigeot, professeur à Rethel, m'envoyait des exemplaires de *Tav. nigra* obtenus par lui des mêmes galles et, en outre, de larves de *Syrphus pyrastri*.

Peut-être faudrait-il encore considérer le genre *Solenaspis* Ashm. comme faisant partie des *Onychiinae;* en établissant ce genre, M. Ashmead l'a placé, dans la table analytique, entre *Figites* et *Aspicera*, au milieu de la sous-famille des *Figitinae* (North American Hymenoptera, 1887, p. 151); l'auteur a malheureusement omis de signaler pour les genres *Onychia, Aspicera* et *Homalaspis* le caractère si frappant, à savoir la conformation liguliforme du second segment abdominal, d'après laquelle Förster a formé pour ces trois genres la sous-famille des *Onychiinae*. Il est possible que *Solenaspis* Ashm. offre le même caractère; il serait, en ce cas, synonyme de *Neralsia* Cam.

Remarque sur le genre *Xyalaspis* Hart. [Cynipide]

Par J.-J. Kieffer.

Le type de ce genre est *X. laevigatus* Hart. Nous y ajoutons encore les espèces suivantes : *spiniger* (Reinh.), *subulifer* (Thoms.), *petiolatus* n. nov. (*subulifer* Cam. nec Thom.), *abietinus* (Thoms.), *scoticus* (Cam.), *armatus* (Gir.) avec la var. *fuscicornis* m. (*armatus* Reinh.).

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (*C. R. hebdom. des Séances*), 1901, I, 12-13. — J. Künckel d'Herculais : Le grand Acridien migrateur américain (*Schistocerca americana* Drury) : migrations et aire de distribution géographique. — P. Lesne : La variation sexuelle chez les mâles de certains Coléoptères appartenant à la famille des Bostrychides; la pœcilandrie périodique. — P. Vigier : Sur l'origine des parasomes ou pyrénosomes dans les cellules de la glande digestive de l'Écrevisse.

Académie des Sciences de Cracovie (*Bulletin international*), décembre 1900. — F. Schille : La faune les Lépidoptères de la vallée du Poprad et de ses affluents, 3e mém. — S. Klemensiewicz : Lépidoptères de Galicie nouveaux ou peu connus, 1er supplément.

Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg (*Annuaire du Musée*

zoologique), 1900, IV. — O. Herz : Meine Lepidopteren-Ausbeute im nördlichen Buchara und im Seravschan-Gebiete im Jahre 1892.

Annals and Magazine of Natural History, avril 1901. — F.-O.-P. Cambridge : On a Collection of Spiders from the Bahama Islands made by J.-L. Bouhote, with Characters of a new Genus and Species of *Mygalomorphae* (pl.). — T.-D.-A. Cockerell : Contributions from the New Mexico Biological Station, XI. New and little-known Insects from New Mexico. — R.-I. Pocock : Diagnoses of some new Species of Spiders from Mashonaland. — H.-S. Gorham : Descriptions of Genera and Species of Coleoptera from South Africa. — P. Cameron : Description of seventeen new Genera of *Ichneumonidae* from India and one of Australia.

Bosnien und der Hercegovina (*Wissenschaftliche Mittheilungen*), VII, 1900. — P.-G. Strobl : Dipterenfauna von Bosnien, Hercegovina und Dalmatien. — F. Klapalek : Beiträge zur Kenntniss der Trichopteren und Neuropteren-Fauna von Bosnien und der Hercegovina (1 pl.).

Diffusion des Sciences (*La*), IV, n° 2, 1901. ⊙

Entomologist (*The*), avril 1901. — E. Green : Biologic Notes on some Ceylonese Rhynchota, n° 1 (fig.). — G.-W. Kirkaldy : Miscellanea Rhynchotalia. — The Study of Life-History. — Notes and Observations.

Entomologist's monthly Magazine (*The*), avril 1901. — R. Newstead : Observations on Coccidae, n° 19 (fig.). — E. Green : Moth catching by electric Light at the Boer Camp Diyatelawa, Ceylon. — G.-C. Champion : Some Remarks on the British Species of *Limnius*. — E. Austen : The Life History of Warble-Flies. — F.-D. Morice : Hymenopterological Notes. — J.-E. Collin : The *Heteromyza* Fallén (Helomyzidae), fig. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes, XXXI, 366, 1901. — Abbé C. Frionnet : Faune entomologique de la Hte-Marne. Tableaux analytiques pour la détermination des principales chenilles de Macrolépidoptères, pl. — Abbé J.-J. Kieffer : Revision des Eucœlines (Hyménoptères Cynipides). — Notes spéciales et locales.

Naturaliste (*Le*), 1er avril 1901. — Les plantes de France, leurs Papillons et leurs Chenilles.

New York Agricultural Experiment Station, nos 182-187, 1900. ⊙

R. Accademia dei Lincei (*Atti*), 1901, I, 6. ⊙

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, janvier 1901. — Dr Pommerol : Un Hémiptère destructeur des chenilles du Pommier.

Revista chilena de Historia natural, janvier 1901. — E. Simon : Liste des Arachnides recueillis par M. Ch. Porter en 1899, à Quilpué et à Molle, et par M. B. Wilson, en avril 1900, au Rio Aysen (Patagonie occidentale) et descriptions d'espèces nouvelles. — E.-C. Reed : Synopsis de los Hemipteros de Chile.

Rivista di Patalogia végétale, VIII, 7-12; IX, 1-5, 1900. — Dr G. Leonardi : Sistema delle « Parlatoriae ». — G. Cecconi : Casi di danneggiamenti a piante legnose causati dal *Morimus asper* Sulz. e dal *Lamia textor* L. allo stato di Insetti perfetti. — G. Mottareale : Su di un caso di fasciazione spirale nel *Linum strictum* L. (fig.). — A. Berlese : Gli Acari agrari (fig.). — G. Leonardi : Saggio di sistematica degli *Aspidiotus* (fig.). — C. Ribaga : Osservazioni sull' Anatomia del *Trichopsocus Dalii* M. Lachl. — Descrizione e figura della *Trombella otiorum* n. sp. (fig.). — Dott. C. Ribaga : Osservazioni circa l'Anatomia del *Trichopsocus Dalii* M. Lachl.

Rovartani Lapok, 1901, 3. — Notes entomologiques en langue hongroise.

Royal Society. — 1° *Proceedings,* n° 443, 1900. ⊙. — 2° *Reports to the Malaria Committee;* S.-R. Christophers : The Anatomy and Histology of the Adult Female Mosquito (6 pl.).

Societas Entomologica, XVI, 1, 1901. — G. Breddin : Neue Arte der Wanzengattung *Caenocoris* Fieb. — F. Himsl : Prodomus einer Macrolepidopteren-Fauna des Traun- und Mühlkreises in Oberösterreich. — P. Born : Meine Excursion von 1900. — E. Lorenz : Verwehte Lepidopteren.

Société entomologique de Belgique (*Annales*), XLX, 3, 1901. — De Crombugghe de Pickendaele : Note sur quelques Microlépidoptères de la faune belge. — S. Schenkling : Neue Cleriden des Königl. Museums zu Brüssel.

Anonyme : Les poulaillers roulants et la destruction des Insectes. (art. du *Journ. Comm.*), 1901.*

Belon (R. P.) : Le genre *Cortilena* Mots. (Lathrididae) et synopse de toutes les espèces actuellement connues (*Ann. Soc. Ent. Belg.*), 1901, 4 p.*

Breddin (G.) : Le Mimétisme chez les Hémiptères, trad. de M. Laurent (*Soc. Linn. Nord Fr.*), 1900, 20 p. — Don de M. L. Bedel.

Chevreux (E.) : Diagnose d'un Crustacé amphipode nouveau de la famille des *Stenothoidae* (*Parametopa Kervillei* n. g. et sp., etc.) (*Soc. A. Sc. Rouen*), 1901, 2 p.*

Escherich (K.) : Ueber das regelmässige Vorkommen von Sprosskilzen in dem Darmepithel eines Käfers (*Zool. Inst. Heidelb.*), 1900, 9 p. (fig.).*

Id. : Ueber die Bildung der Keimblätter bei den Musciden (*Abh. K. Leop. Car. Deutsch. Akad. Naturf.*), 1900 (pl. et fig.).*

Houard (C.) : Sur quelques Zoocécidies nouvelles récoltées en Algérie (*Rev. gén. Bot.*), 1991, 11 p. (fig.).*

Lameere (Aug.) : Discours prononcé à l'Assemblée générale du 26 décembre 1900 (*Ann. Soc. Ent. Belg.*), 1901, 6 p.*

Pic (M.) : Description d'un *Otiorrhynchus* nouveau, du Nord de l'Afrique (*Bull. Soc. Ent. Belg.*), 1900, 2 p.*

Id. : Note complémentaire sur *Malthinus maritimus* Pic (*loc. cit.*), 1900, 3 p.*

Id. : Diagnoses de *Macratria* et d'Anthicidae de la Malaisie (*Ann. Mus. civ. St. n. Gen.*), 1901, 15 p.*

Id. : Hylophilidae de la Malaisie et nouveau genre d'Anthicidae de Sumatra (*loc. cit.*), 1901, 6 p.*

Id. : Anthicidae de l'Erythrée (*loc. cit.*), 1900, 2 p.*

Id. : Notes diverses et diagnoses, 1 et 2 (*L'Échange*), 7 p.*

Id. : Neue Coleopteren des Hamburger Museums (*Mitth. Naturh. Mus.*), 1900, 4 p.*

Pierre (Abbé) : Nouvelles cécidiologiques (*Rev. Sc. Bourb.*), 1901, 3 p. (fig.).*

Plateau (F.) : Observations sur le Phénomène de la Constance chez quelques Hyménoptères (*Ann. Soc. Ent. Belg.*), 1901, 16 p.

Id. : Expériences sur l'attraction des Insectes par les étoffes colorées et les objets brillants (*loc. cit.*) 1900, 16 p.*

Selys-Longchamps (E. de) : Additions au Synopsis des Cordulines (*Bull. Acad. R. Belg.*), 1874, 19 p. — Don de M. L. Bedel.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : J. de Gaulle.